**Bembidion** forts.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| bipunctatum (Linnaeus, 1761) | | 99 | Sk Bl Ha Sm Öl Go .. Ög Vg Bo Ds .. Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To | DNFSKEAI |
| ruficolle (Panzer, 1797) | 4* | 100 | Sk .. .. Sm .. Go GS .. .. .. .. .. .. .. .. Vr Dr .. .. Me .. .. Ån Vb .. .. .. .. .. .. .. | D FSKEAI |
| pallidipenne (Illiger, 1802) | | 101 | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS .. Vg .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | DN S EAI |
| tetragrammum Chaudoir, 1846 | | | | |
| genei Kuster, 1847 | | | | |
| t. illigeri Netolitzky, 1914 | | 102 | Sk Bl Ha Sm Öl Go .. Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | D FS EAI |
| fellmani (Mannerheim, 1823) | | 103 | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Dr .. Hs .. Hr Jä .. .. .. .. .. Pi Lu To | NFSK |
| difficile (Motschulsky, 1844) | | 104 | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Vr Dr .. Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To | NFSK |
| crenulatum F. Sahlberg, 1844 | | | | |
| c. ponojense J. Sahlberg, 1875 | | 104a | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | K |
| prasinum (Duftschmid, 1812) | | 105 | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Up .. Vr Dr .. Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly .. Lu To | NFSK |
| hyperboraeorum Munster, 1923 | | 106 | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Jä .. .. Nb Ås Ly Pi Lu To | NFSK |
| virens (Gyllenhal, 1827) | | 107 | .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bo .. .. .. Up .. Vr Dr Gä Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly .. Lu To | NFSK |
| hasti Sahlberg, 1827 | | 108 | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Hr Jä .. Vb Nb Ås Ly Pi Lu To | NFSK |
| hirmocaelum Chaudoir, 1850 | | 108a | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | K |
| tibiale (Duftschmid, 1812) | | 108b | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | N |
| mckinleyi Fall, 1926 | | | | |
| mckinleyi scandicum Lindroth, 1943 | | 109 | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. To | NFS |
| monticola Sturm, 1825 | | 109a | b atrocoeruleum .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | D F KEAI |
| deletum Audinet-Serville, 1821 | | 110 | Sk Bl Ha Sm Öl .. .. Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr .. .. .. Hr Jä .. .. .. Ås Ly .. .. .. | DNFSKEAI D |
| nitidulum (Marsham, 1802 nec Schreber, 1781) | | | | |
| grapii Gyllenhal, 1827 | | 111 | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Vr Dr .. Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To | NFSK |
| yukonum Fall, 1926 | | 112 | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. To | NFSK |
| grapeioides Munster, 1930 | | | | |
| dauricum (Motschulsky, 1844) | | 113 | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Lu To | NFS |
| stephensi Crotch, 1866 | 4* | 114 | Sk .. .. .. .. .. .. .. Vg Bo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | DNFSKEAI |
| lunatum (Duftschmid, 1812) | | 115 | Sk .. .. .. Öl .. .. .. Vg Bo .. .. .. .. .. Vr .. .. .. Me .. Jä .. .. .. .. .. .. .. .. | DN S AI |
| tetracolum Say, 1823 | | 116 | Sk Bl Ha Sm Öl Go .. Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr .. Hs Me .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | DNFSKEAI |
| ustulatum auct. nec (Linnaeus, 1758) | | | | |
| bruxellense Wesmael, 1835 | | 117 | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To | DNFSKEAI |
| rupestre auct. nec (Linnaeus, 1758) | | | | |
| petrosum Gebler, 1833j | | | | |
| pet. siebkei Sparre Schneider, 1909 | | 118 | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Vr .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. To | NFSK |
| petrosum carlhlindrothi Kangas,1980 | | 118a | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | K |
| andreae (Fabricius, 1787) | | | | |
| andreae polonicum Müller, 1930 | 2* | 119 | Sk .. Ha .. .. Go .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ås .. .. .. .. | D FSKEAI |
| femoratum Sturm, 1825 | | 120 | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo .. Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi .. .. | DNFSKEAI |
| maritimum Stephens, 1835 | | 120a | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | D |
| concinnum auct. nec Stephens, 1828 | | | | |
| obscurellum (Motschulsky, 1845) | | 121 | Sk .. .. .. .. Go GS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | D SK |
| repandum J. Sahlberg, 1875 | | | | |
| saxatile Gyllenhal, 1827 | | 122 | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly .. Lu .. | DNFSKEAI |
| decorum (Panzer, 1800) scapulinum b | | 122a | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Jä .. .. .. .. .. .. .. .. | D |
| dentellum (Thunberg, 1787) | | 123 | Sk Bl Ha Sm Öl Go .. Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me .. Jä Ån Vb .. .. .. .. .. .. | DNFSKEAI |
| tinctum Zetterstedt, 1828 | | 124 | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Me .. Jä Ån Vb Nb Ås Ly .. Lu To | FSK |
| varium (Olivier, 1795) | | 125 | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg .. .. Nä Sö Up .. .. .. .. .. .. .. .. Ån .. .. .. .. .. .. .. | DNFS EAI |
| semipunctatum (Donovan, 1806) | 4* | 126 | Sk .. .. .. Öl Go .. .. .. .. .. .. .. .. .. Vr Dr .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | iNFSKEAI |
| obliquum Sturm, 1825 | | 127 | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly .. Lu To | DNFSKEAI |
| ephippium (Marsham, 1802) | | 127a | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | D |
| minimum (Fabricius, 1792) | | 128 | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo .. .. Sö .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | DNFSKE I |
| normannum Dejean, 1831 | | 128a | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | D |
| azurescens (Dalla Torre, 1877) | 2* | 129 | .. .. .. .. .. Go .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | SKEAI |
| tenellum Erichson, 1837 | | 130 | Sk .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | D S E I |
| articulatum (Panzer, 1797) | | 131 | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo .. Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä .. .. .. .. .. Vb .. .. .. .. .. .. | DNFSKEAI |
| octomaculatum (Goeze, 1777) | | 132 | Sk .. .. .. .. Go .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | D FS AI |
| doris (Panzer, 1797) | | 133 | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To | DNFSKEAI |
| schueppeli Dejean, 1831 | | 134 | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Vr .. .. .. Me .. .. Ån Vb Nb .. Ly .. .. .. | DNFSKEAI |
| chaudoiri Chaudoir, 1850 | | 134a | .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | K |

110: Sö L.W.-Hr, GS; Up, H.W.; Vs, NJ; Öl, CF; (as C.H.L.

114: Bo TB, And;

122b: utplanterad från New Foundland vid Indalsälven vid Byggården (1947)

(lilla Saxatilis med 1 par gulröda fläckar på täckv.

126: Öl, H.Lj;

109b: B. atrocoeruleum (Stephens, D; DK

130: Ås CJ.

115: NF, Bo;

128: Ög, S.Le;